

サソリガイ

分類：中腹足目 スイショウガイ科 (腹足綱)
 学名：*Lambis crocata*
 英名：Orange spider conch

太平洋及び印度洋の亜熱帯から熱帯海域に分布し、珊瑚礁の砂の中の水深20~40m位のところに生息する。和名はサソリに似ていることに由来する。殻は大型で、15cm内外、外唇は厚く堅固で長い棘状の突起が、外側へ捲れるように並び、L字型の水管部を含め7本ある。殻口はやや薄い紅色で平滑。同属のフシデサソリ(*L. scorpis*)は前種と類似するが、長い棘状の突起にイボのような結節があって、棘状突起の間には短い棘が1~2個見られる。殻口は紫紅色で外唇、内唇共白いヒダ状の刻み目が多数見られる。



サソリガイ



ムラサキムカデサソリガイ
L. violacea



フシデサソリ



フシデサソリ



オニサソリガイ *L. robusta*



クモガイ *L. lambis*



サソリガイ



フシデサソリ



フシデサソリ



上から リュウキュウオウギ *Chamys radula*
 マガキガイ *Strombus luhuanus*
 クモガイ *Lambis lambis*




フシデサソリ



サソリガイ



ラクダガイ *Lambis truncata*



オニサソリガイ *Lambis robusta*