

ミヤコボラ

分類：中腹足目 オキニシ科(腹足綱)
 学名：*Bursa rana*
 英名：Frog shell

太平洋、印度洋の温帯から熱帯海域の水深10m～20m位のところに生息する。殻は中型で重厚堅固、殻の両側左右には鱗状の隆起が見られ、その上に、牙状の突起がある。螺層には顆粒状の螺肋があって肩部および体層にはイボ状の突起が顕著である。殻口は長卵形で白色、水管は太く伸びる。外唇内縁および内唇内縁共に歯状のひだが見られる。



ミヤコボラ
 (*Ranella spinosa*は同定の誤り)



ソマリアボラ
Bursa barclayi



イワカワウネボラ
Bursa granularis



シワクチナルトボラ
Bursa rubeta
 (*B. bubo*は同定の誤り)



ギニアナルトボラ
Bursa scrobiculata


シノマキ(シノマキガイ)

分類：中腹足目 フジツガイ科(腹足綱)
 学名：*Cymatium Dileare*
 英名：Atlantic hairy triton

全世界の温帯から熱帯にかけての10m～20m位の浅所に生息する。紀伊半島ではイセエビの刺網により漁獲されるが、数量は少ない。殻は毛の生えた殻皮に被われ、螺脈と縦脈とが交叉して小顆粒が見られる。殻の色は褐色と白色の帯が交互に数条あるが、個体差がある。殻の内縁は鮮朱褐色で内唇は反りかえって白色の数条のひだがあり、外唇は肥厚する。水管はや、長く、少し曲折する。和名のシノマキは殻表を取り巻く強い肋条の様子から篠巻きに由来する。



ソマリアフジツガイ
C. rangani



シノマキ



シノマキ



フロリダイボボラ
Distorsio clathrata



コオモリボラ



フロリダイボボラ



コオモリボラ
C. femorale