

マジエラン アイナメ

分類：スズキ目 ノトセニア科  
学名：*Dissostichus eleginoides*  
英名：Patagonian toothfish

パタゴニア、フォークランド海域からスコシア海、ケルゲレン諸島にかけて分布。体形は細長く小さな円鱗におおわれる。頭部はやや縦扁し、その背面は平坦、両眼隔域は広く、長楕円形の無鱗域が1対ある。口は大きく下ガクはやや突出、両ガク歯は鋭く犬歯状で、上ガク歯は2列、下ガク歯は1列。側線は2本で、下側の側線の第2背鰭起点直下よりやや後方から始まる。体色は灰褐色で不定形の暗色斑がある。

ノトセニア科の中で最も大きくなる種で最大2mにも達するものもあるが、普通70cm位、通常水深1,000mの海底に生息し、魚類を捕食する。



コオリカマス

分類：スズキ目 コオリウオ科  
学名：*Champscephalus gunnari*  
英名：Mackerel icefish

スコシア海域、南極半島、ブーベ島、ケルゲレン諸島にかけて分布。体形は細長く無鱗。本科の他の魚類に比べ、頭部が小さい。側線は2本、吻端近くに棘をもたない。鼻孔は1対、尾鰭後縁中央は湾入。体色は緑がかかった灰褐色で銀色を帯び、体側には10数条の暗色横帶をもつ。成熟したオスは黒味をおびる。通常100~700mの海底に生息し、オキアミ類や小形の魚類を捕食する。産卵期は3~6月。体長35cm、底曳網で大量に漁獲されて、食用となる。

