

アオブダイ亜科 キツネブダイ属 (1)

分 類: スズキ目 ベラ亜目 ブダイ科
学 名: 各項に記載
英 名: Parrot fish

全世界の熱帯、亜熱帯のサンゴ礁や岩礁地帯に分布し、日本では房総半島以南の黒潮流域に生息し、特に小笠原、沖縄海域に多い。小さな歯が密生してくっつきあったオウムの嘴のような歯はサンゴや海草をつけばむに適し、口腔の奥にある3ヶの咽頭歯で噛み碎き、未消化の石灰質、排泄物を後方に煙のように撒き散らす。体色は種により異なり毒々しい程の原色に彩られ斑紋も多種多様である。体長は各種により相異なり30cm~200cm位迄。



ムナグロブダイ類
Scarus pectoralis
仏領ソマリー海岸 -1959-



左と同じ



ハゲブダイ類♀
S. sordidus
マリ -1960-



ハゲブダイ類
バーブダ -1968-



ハゲブダイ類
セント・ビンセント -1975-



ハゲブダイ類(幼魚)
セネガル -1966-



チブダイ
S. niger
アフアール・イサ -1971-



ハゲブダイ類
コロンビア -1960-

アオブダイ亜科 キツネブダイ属 (2)



レモンブダイ類
S. blochi
ヨルダン -1974-



アカブダイ類
S. caudofasciatus
ニュージーランド -1970-



レモンブダイ類
S. blochi
ヨルダン -1974-



Scarus. sp.
カイマン諸島 -1950-



左に同じ -1953-



Scarus. sp.
英領バージン諸島 -1975-




アミメブダイ
S. frenatus
フィリピン -1972-



Scarus. sp.
英領印度洋地域 -1968-



S. guacamaia
ブルンジ -1974-



S. dimidiatus
ガボン -1975-



S. guacamaia
ブルンジ -1974-